DIFFERENCE BETWEEN TROPOSPHERE AND STRATOSPHERE

TROPOSPHERE	STRATOSPHERE
1. বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হল ট্রপোস্ফিয়ার, যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে মেরু অঞ্চলে প্রায় 8-9 কিমি এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে 16-18 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত।	1. ট্রপোপজের পরবর্তী স্তর হল স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ট্রপোপজ থেকে 50 কিমি পর্যন্ত স্ট্রাটোস্ফিয়ার বিস্তৃত।
2. ট্রপোস্ফিয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা 6.4°C হারে হ্রাস পায়।	2. স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পায়।
3. ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলীয় ঘোলাটেভাব লক্ষ্য করা যায়, তাই একে বলা মুক্তমণ্ডল।	3. কোনো বায়ুমণ্ডলীয় ঘোলা ভাব লক্ষ্য করা যায় না, তাই একে কাচমণ্ডল বলা।
4. ট্রপোস্ফিয়ার মুক্তমণ্ডল হওয়ায় এই স্তরের মধ্য দিয়ে বেগে বিমান ঘুরি ঘোরাচলা করতে পারে না।	4. স্ট্রাটোস্ফিয়ার কাচমণ্ডল হওয়ায় এই স্তরের মধ্য দিয়ে বেগে বিমান ঘুরি ঘোরাচলা করতে পারে।
5. ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন (O_2), N_2, CO_2 প্রভৃতি গ্যাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।	5. স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোনস্তরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।
6. ট্রপোস্ফিয়ারে ঐশ্বর্যীমা ট্রপোপজ।	6. স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ঐশ্বর্যীমা স্ট্রাটোপজ।

Scanned with CamScanner